

**Medicina Interna**

Dr. med. P. Egger, Chefarzt  
Dr. med. M. Kubli, Stv. Chefarzt

## **Informação e declaração de consentimento para tratamento elétrico de distúrbios do ritmo cardíaco (cardioversão elétrica)**

Caro(a) paciente,

Com base nos seus sintomas e nos resultados de exames anteriores, foi-lhe indicada uma cardioversão elétrica para um distúrbio do ritmo cardíaco. Com este tratamento, o distúrbio do ritmo cardíaco que lhe foi diagnosticado deverá ser eliminado.

### **Procedimento clínico**

Deverá comparecer em jejum (ou seja, sem comer nem beber nas 6 horas precedentes) para o tratamento. Além disso, caso siga uma terapia de hemodiluição, agradecemos que traga consigo a correspondente declaração médica com os valores INR/Quick medidos pelo seu clínico. Antes da intervenção, serão controlados os valores de potássio e de coagulação sanguínea (recolha de amostras de sangue: a recolha de amostras de sangue deve ter sido efetuada há menos de 7 dias, os valores de Quick/INR têm de ser determinados no dia da cardioversão elétrica). As próteses dentárias devem ser retiradas antes da intervenção. Na parte anterior e posterior do seu tórax será colocado um eletrodo de grande superfície. Através destes eletrodos, é aplicado um curto choque elétrico, para eliminar o seu distúrbio do ritmo cardíaco e repor o batimento cardíaco normal (regular). Para que não sinta o choque elétrico durante o tratamento, ser-lhe-á ministrada uma anestesia por poucos minutos.

### **Possíveis complicações**

Embora, regra geral, o tratamento decorra sem complicações, pela sua própria natureza, não é possível garantir que esteja isento de riscos. Excluindo as irritações cutâneas passageiras no peito devidas à aplicação/colagem dos eletrodos para a terapia de choque, não são de esperar efeitos adversos do tratamento propriamente dito. Reações de hipersensibilidade à anestesia, incidentes causados pela narcose, a ocorrência de distúrbios do ritmo de outro tipo ou a libertação de coágulos sanguíneos do coração (embolia) são complicações muito raras. De modo a combater a formação e libertação de coágulos sanguíneos, o seu sangue é diluído previamente com um medicamento (p. ex., Marcoumar, Xarelto). Eventualmente, antes da cardioversão elétrica, será necessário realizar um exame por ultrassons através do esófago (ecocardiografia transesofágica). Mas falaremos consigo sobre este tema em separado. No seu conjunto, os benefícios desta intervenção superam, de longe, os seus riscos.



## Após o tratamento/cardioversão elétrica

Após o tratamento, deverá permanecer em repouso absoluto por algumas horas, segundo a recomendação do médico. O efeito da anestesia deverá desvanecer-se completamente, para que possa comer, beber ou, até, pôr-se de pé. Para poder sair após o exame, que, em regra, pode realizar-se em ambulatório (sem pernoita no hospital), fale novamente com o seu médico responsável. Não é permitido, em nenhuma circunstância, conduzir um automóvel ou qualquer outro veículo na via pública no dia do tratamento (após a anestesia).

**Por favor, fale connosco**, caso necessite de esclarecimentos ou lhe ocorra algo importante que não tenha sido referido nesta carta ou na sua conversa pessoal com o médico.

## Declaração de consentimento

Com base na comunicação informativa e nos resultados dos exames prévios, o Sr. Dr./Sr.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> . . . . . teve hoje comigo uma conversa de esclarecimento conclusiva. Compreendi a explicação e tive a possibilidade de fazer todas as perguntas do meu interesse. Após uma resposta exaustiva às minhas questões, declaro, por este meio, que permito a realização do tratamento proposto. Concordo com eventuais intervenções subsequentes imediatamente necessárias.

---

Local/data

Assinatura do/da paciente

Assinatura do médico/médica